Factores a tener en cuenta antes de administrar la inmunoterapia

- Fiebre en los 5 días previos a la administración.
- Agudización de síntomas respiratorios.
- Afectación cutánea grave, severidad de dermatitis.
- Agravamiento del proceso alérgico
- Haber recibido vacuna de virus vivo (en este caso esperar 10 días).
- Nódulos por escasa absorción de dosis previas.
- Embarazo.
- Inicio de otras enfermedades infecciosas, cardiológicas, diabetes, hipertensión arterial, etc.
- Enfermedades autoinmunes, hepatopatías, cáncer, inmunodeficiencias, etc.
- Nueva medicación, especialmente hipotensores: Betabloqueantes, IECAs.

Si presenta alguno de estos factores, comuníquelo al personal de enfermería y/o al especialista de alergología antes de administrar la dosis.

Gracias por confiar en nosotros

Esperamos que la atención recibida satisfaga sus necesidades y le deseamos una plena y pronta recuperación.

Contacto:

2ª Planta Centro (entre el área de Consultas y Hospitalización)

Horario: de 9 a 13 h.

Secretaría: 958 02 18 92

https://www.husc.es/especialidades/alergologia

HOSPITAL UNIVERSITARIO **CLÍNICO SAN CECILIO**

PARQUE TECNOLÓGICO DE LA SALUD DE GRANADA

Avenida de la Investigación, s/n. Granada. 958 023 000

@clinicodegranada www.clinicodegranada.es

Red andaluza de servicios sanitarios y espacios libres de humo

Guía informativa sobre la Inmunoterapia Alergénica (ITA)

Unidad de Inmunoterapia. Servicio de Alergología



Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Familias

¿Que es la Inmunoterapia Alergénica (ITA)?

- Único tratamiento etiológico específico de las enfermedades alérgicas capaz de modificar el curso natural de la enfermedad. También conocida como vacuna para la alergia, desarrolla en el paciente una tolerancia a los alérgenos administrados.

- Administración de un extracto alergénico frente al que el paciente está sensibilizado.

- Tratamiento largo, de 3 a 5 años.

- Personalizado, ya que la composición de la ITA es específica para cada enfermo.

El paciente debe seguir tomando el tratamiento preventivo y sintomático hasta que su enfermedad mejore.

Tipos de inmunoterapia

• **Inyectada:**

Vía de administración subcutánea.
Se administrará en un centro médico con experiencia en este tipo de tratamiento.
Tras la administración de cada dosis deberá permanecer 30 minutos para control de posibles efectos adversos.

30 min

• **Sublingual:**

Aplicación de comprimidos o gotas debajo de la lengua.
La primera dosis se administrará en la Unidad de Inmunoterapia. Posteriormente, se formará al paciente para la administración en su domicilio.

Fases de tratamiento

• **Inicial:**

Se recomienda acudir a su hospital de referencia. La Unidad de Inmunoterapia le administrará la dosis inicial y se irá aumentando progresivamente hasta llegar a dosis de mantenimiento.

• **Mantenimiento:**

Dosis mensuales que podrán ser administradas en sus centros de salud, o en la Unidad de Inmunoterapia del hospital. En ambos casos bajo supervisión médica.

Conservación del producto

• Debe conservarse en la nevera a una temperatura comprendida entre +2° y +8°, en su caja y en posición vertical.
• Evitar que se congele.
• El transporte hasta el centro de vacunación se realizará en nevera con placa de hielo.

Receta de la vacuna

La primera receta la expedirá el médico especialista de la unidad.

Se llevará la receta a la farmacia y en el plazo de varias semanas, según composición y según el laboratorio, recibirá la ITA. En ella encontrará la pauta de administración.

La renovación de la vacuna la hará el especialista en Alergología o el Médico de Atención Primaria.

Posibles efectos secundarios

• **Locales:**

Endurecimiento en el brazo, inflamación, ligero calor local de forma inmediata o bien tardía.

Plan de actuación:

- Aplicar hielo en la zona y consultar antes de aplicar la siguiente dosis.
- No masajear la zona.
- Evitar el ejercicio en varias horas, favoreciendo que el alérgeno se deposite lentamente.

• **Sistémicas:**

Con menos frecuencia pueden aparecer los síntomas de alergia: Estornudos, tos, lagrimeos o asma.

Reacciones en la piel.

Excepcionalmente, se pueden observar reacciones generales graves.

Plan de actuación:

- Acudirá al servicio de urgencias, suspenderá momentáneamente la vacuna y consultará con el Alergólogo.

Extractos disponibles

Pólenes
Ácaros polvo
Epitelios
Hongos
Látex
Venenos Himenópteros
Alimentos: proteína LTP de melocotón.